

5ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ι.Δ.Κ. (Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο)

# ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

3.3.2018

Hotel Nikopolis, Θεσσαλονίκη

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αντικαρκινική Ενημέρωση



Επαγγελματική Ένωση  
Γενικών Χειρουργών Ελλάδος

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



ΙΑΤΡΙΚΟ  
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



# Abseamed®

Epoetin alfa

Νέα ζωή!

Για συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο της εταιρείας



ABS / 03 / RAF / 01.2017 / ADV



RAFARM Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Κορίνθου 12, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ.: 210 6776550 - 1 • Fax: 210 6776552 • e-mail: info@rafarm.gr  
[www.rafarm.gr](http://www.rafarm.gr)



# ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

3.3.2018

Hotel Nikopolis, Θεσσαλονίκη



## ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

---

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στην ημερίδα με θέμα «Στρωματικοί και νευροενδοκρινικοί όγκοι του Πεπτικού».

Οι όγκοι αυτοί αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία νεοπλασμάτων, με ανανεωμένη ορολογία και σταδιοποίηση, που απαιτούν εξειδικευμένη και ιδιαίτερη αντιμετώπιση τόσο στην εκτίμηση της επικινδυνότητάς τους όσο και στην θεραπεία. Απαιτούν συνδυασμό μιας σωστής χειρουργικής, βιολογικής, και θεραπευτικής προσέγγισης. Είναι συχνά οι όγκοι που παραμελούνται στα μεγάλα συνέδρια που κυρίως ασχολούνται με τις μείζονες και πιο συνήθεις κακοήθειες. Αυτό κάνει την ημερίδα μας ακόμα πιο αναγκαία και χρήσιμη για τον κλινικό γιατρό.

Επειδή η θεραπεία τους απαιτεί συνεργασία πολλών ειδικοτήτων, οι ομιλητές και οι πρόεδροι είναι ανάμεσα στους πιο ειδικούς από 7 διαφορετικές ειδικότητες.

Η ημερίδα εντάσσεται στο πρόγραμμα των Διεπιστημονικών συνεδρίων που οργανώνει το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, επειδή πιστεύουμε ότι μόνο με την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων ειδικοτήτων, μόνο τότε προάγεται πραγματικά το γνωστικό αντικείμενο.

Σας προσκαλούμε λοιπόν να μετάσχετε σε έναν γόνιμο διάλογο. Έχουμε επιδιώξει να είναι οι εισηγήσεις περιεκτικές και συνοπτικές ώστε να απομείνει ικανός χρόνος για την συζήτηση που θα ακολουθεί τις ομιλίες.

Με εκτίμηση,

Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής


Χρήστος Εμμανουηλίδης  
Παθολόγος – Ογκολόγος

Γεώργιος Μπασδάνης  
Γενικός Χειρουργός,  
Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ  
ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ  
ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

3.3.2018

Hotel Nikopolis, Θεσσαλονίκη



## ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

---

### Πρόεδροι

Μπασδάνης Γεώργιος  
Εμμανουλίδης Χρήστος

### Μέλη


Φωτιάδης Παναγιώτης  
Κοσμίδης Χριστόφορος  
Τζεβελέκη Ιωάννα  
Διαμαντίδης Δημήτριος



ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ  
ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ  
ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

3.3.2018

Hotel Nikopolis, Θεσσαλονίκη



## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

---

08.00-09.00 Εγγραφές

09.00-09.10 Χαιρετισμοί

---

### 09.10-10.15 ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ (GIST)

Προεδρείο: Δρεβελέγκας Αντώνιος, Κουκλάκης Γεώργιος,  
Παντολέων Δημήτριος

---

09.10-09.22 **Επιδημιολογία και Παθολογική εκτίμηση των GIST**  
Παπαζιώγας Βασίλειος

09.22-09.34 **Μοριακή βιολογία των GIST**  
Κεσίσης Γεώργιος

09.34-09.46 **Ακτινολογική εκτίμηση**  
Χουρμούζη Δανάη

09.46-09.58 **Ενδοσκοπική διερεύνηση**  
Κουκλάκης Γεώργιος

09.58-10.15 Συζήτηση

---

### 10.15-11.20 ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Προεδρείο: Μπασδάνης Γεώργιος, Ανδρεάδης Χαράλαμπος,  
Ηλιάδης Γεώργιος, Παπαβραμίδης Θεοδόσιος

---

10.15-10.27 **Ο ρόλος του χειρουργού – κατευθυντήριες οδηγίες**  
Παραμυθιώτης Δανιήλ

10.27-10.39 **Στοχευμένη θεραπεία του μετασταστικού GIST**  
Ράλλης Γρηγόριος

10.39-10.51 **Μετεγχειρητική θεραπεία, ποιά, πότε και γιατί**  
Καντζιούρα Αρετή

10.51-11.03 **Υπάρχει λογική για ανοσοθεραπεία;**  
Λέββα Σοφία

11.03-11.20 Συζήτηση

11.20-12.00 **Διάλειμμα – Καφές**



# CYRAMZA<sup>®</sup>

(ramucirumab)



GASTRIC



NSCLC



CRC

## TAKE ACTION



TRAINED TO MAKE  
A DIFFERENCE  
ABLE TO MAKE  
AN IMPACT

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Εταιρεία

0158424241\_02/02-2018 CONVEY




ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά **ΤΗΛ.:** 210 6294600 **Fax:** 210 6294610  
**Για παραγγελίες: ΤΗΛ.:** 210 6294629 **Fax:** 210 6294630 **e-mail:** [orders@lilly.gr](mailto:orders@lilly.gr) [www.lilly.gr](http://www.lilly.gr)

ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ  
ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ  
ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

3.3.2018

Hotel Nikopolis, Θεσσαλονίκη



## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

### 12.00-13.20 ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ (NET) – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ

Προεδρείο: Κουμαριανού Άννα, Μιχαλόπουλος Αντώνιος, Ξανθάκης Ιωάννης

- 12:00-12:12 **Επιδημιολογία / Ταξινόμηση**  
Κοσμίδης Χριστόφορος
- 12:12-12:24 **Η συμβολή του παθολογοανατόμου στην εκτίμηση των NET**  
Ζαραμπούκας Θωμάς
- 12:24-12:36 **Η εκτίμηση από Ενδοκρινολόγο**  
Παζαΐτου-Παναγιώτου Καλλιόπη
- 12:36-12:48 **Ο ρόλος της πυρηνικής ιατρικής**  
Ζαχαροπούλου Βασιλική
- 12:48-13:00 **Εφαρμογή σύγχρονων υβριδικών τεχνικών (PET/CT) στη διαχείριση των ασθενών**  
Άρσος Γεώργιος
- 13:00-13:20 Συζήτηση

### 13.20-14.25 NET ΠΕΠΤΙΚΟΥ: ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Προεδρείο: Κεσίσσογλου Ισαάκ, Μπάκα Σοφία, Οδυσσέως Χαράλαμπος, Πλιάκος Ιωάννης, Σπηλιώτης Ιωάννης

- 13:20-13:32 **Καρκινοειδές σύνδρομο**  
Καραχάλιος Δημήτριος
- 13:32-13:44 **NET παγκρέατος: διαφορετική οντότητα;**  
Αυγερινός Αντώνιος
- 13:44-13:56 **NET παγκρέατος – Χειρουργική αντιμετώπιση**  
Χατζηθεόκλητος Ευθύμιος
- 13:56-14:08 **Χειρουργική αντιμετώπιση των NET του πεπτικού σωλήνα**  
Πανίδης Σταύρος
- 14:08-14:25 Συζήτηση



# ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΤΕ

# ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ



Το Somatuline® Autogel® 120mg κάνει τη διαφορά με αποδείξεις ως αντινεοπλασματική θεραπεία 1ης γραμμής<sup>2</sup>

**Το 1<sup>ο</sup> και ΜΟΝΑΔΙΚΟ  
ΑΝΑΛΟΓΟ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ  
εγκεκριμένο για τη θεραπεία  
ΚΑΙ των παγκρεατικών  
ΚΑΙ των εντερικών  
νευροενδοκρινών όγκων<sup>1</sup>**

**1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Somatuline® Autogel® 60 / 90 / 120 mg, ενέσιμο διάλυμα σε προγεωμεγμένη σύριγγα. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Lanreotide 60 mg, 90 mg, 120 mg (υπό μορφή lanreotide acetate). Κάθε προγεωμεγμένη σύριγγα περιέχει ένα υπερκρομεμένο διάλυμα lanreotide acetate το οποίο αντιστοιχεί σε 0,246 mg βόσας lanreotide ανά mg διαλύματος, το οποίο επιτρέπει τη χορήγηση μιας δόσης των 60 mg, 90 mg ή 120 mg lanreotide, αντίστοιχα. Για πλήρη κατάλογο των εκδόσεων βλ. παράγραφο 6.1. **4.3. Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθησία στη συστασιασίνη ή ανάλογα πεπτιδία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. **4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Το lanreotide μπορεί να μειώσει την κινητικότητα της κοιλιάς και να οδηγήσει σε σπασμογόμο κοιλίτιδων. Για το λόγο αυτό οι ασθενείς μπορεί να χρειάζεται να παρακολουθούνται περιοδικά. Φαρμακολογικές μελέτες σε ζώα και ανθρώπους δείχνουν ότι το lanreotide, όπως η σωματοστατίνη και άλλα ανάλογα σωματοστατίνης αναστέλλει την έκκριση ινσουλίνης και γλυκαγόνης. Επομένως, ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με lanreotide μπορεί να εμφανίσουν υπογλυκαιμία ή υπεργλυκαιμία. Κατά την έναρξη της θεραπείας με lanreotide ή όταν αλλάξει η δόση, θα πρέπει να παρακολουθούνται τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα και σε περίπτωση ύπαρξης αναδιορθωτικών σφαλμάτων να γίνεται ανάλογη προσαρμογή της δόσολογίας τους. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με lanreotide σε μεγαλύτερους ασθενείς έχει παρατηρηθεί ελάφρα μείωση στη λειτουργία του θυρεοειδούς, όμως οι κλινικές υποθυρεοειδισμούς είναι σπάνιες (<1%). Συνιστώνται έλεγχοι της θυρεοειδικής λειτουργίας όταν ενδείκνυται κλινικά. Σε ασθενείς χωρίς υποκείμενα καρδιακά προβλήματα, το lanreotide μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του καρδιακού ρυθμού, όχι απαραίτητα σε επίπεδα βροδυκαρδίας. Σε ασθενείς με προϋπάρχουσες καρδιακές διαταραχές, η έναρξη χορήγησης lanreotide μπορεί να προκαλέσει φλεβοκομβική βροδυκαρδία. Πρέπει να γίνεται προσοχή κατά την έναρξη της θεραπείας με lanreotide σε ασθενείς με βροδυκαρδία (βλ. παράγραφο 4.5). **4.8. Αντενθίμματα ενέργειες:** Οι αντενθίμματα ενέργειες που αναφέρθηκαν σε κλινικές μελέτες από ασθενείς με μεγαλύτερη και GEP-NETS στους οποίους χορηγήθηκε θεραπεία με lanreotide, κατατάσσονται στα αντίστοιχα οργανικά συστήματα με βάση τη συχνότητα ως εξής: Πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), μη συχνές (≥ 1/1000 έως < 1/100). Οι συχνότερα αναμενόμενες αντενθίμματα ενέργειες, εποχόμενες της θεραπείας με lanreotide είναι γαστρεντερικές διαταραχές (συχνότερα αναφερόμενες είναι η διάρροια και το κοιλιακό άλγος, συνήθως ήπιες ή μέτριες έντασης και παροδικές), κοιλίτιδα (σπάνια συμπτωματική) και τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης (πόνος, οίδημα και ακνηρώσεις). Το προφίλ των αντενθίμτων ενεργειών είναι παρόμοιο για όλες τις ενδείξεις. Διαταραχές μεταβολισμού και θρόμβος: Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10): υπογλυκαιμία, μειωμένη όρεξη\*\*, υπεργλυκαιμία, σακχαρώδης διαβήτης. Ψυχιατρικές διαταραχές: Μη συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100): αϋνία\*. Διαταραχές νευρικού συστήματος: Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10): ζάλη, κεφαλαλγία, λιθόργος\*\*. Καρδιακές διαταραχές: Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10): φλεβοκομβική βροδυκαρδία\*. Αγγειακές διαταραχές: Μη συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100): εζοφίος\*. Γαστρεντερικές διαταραχές: Πολύ συχνές (≥ 1/10): διάρροια, μηλάκη κόπρανα\*, κοιλιακό άλγος. Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10): ναυτία, έμετος, δυσκοιλιότητα, μετεωρισμός, διάταση κοιλίας, κοιλιακή δυσφορία, δυσπεψία στασιόπραση\*\*. Μη συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100): αποκαρωματισμένα κόπρανα\*. Εμπειρία ασφαλείας μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά (μη γνωστές συχνότητες): παγκρεατίτιδα, διαταραχές ήπατος-χοληφόρων: Πολύ συχνές (≥ 1/10): κοιλίτιδα. Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10): διάταση χοληφόρων\*. Διαταραχές μυσσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10): μυοσκελετικός πόνος\*\*, μυαλγία\*\*. Διαταραχές του δέρματος και υποδόριου ιστού: Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10): αλλεργία, ελάτωση τριχοφυΐας\*. Γενικές διαταραχές και τοπικές αντιδράσεις στο σημείο χορήγησης: Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10): ερεθισμένα, κόπωση, αντίδραση στο σημείο της ένεσης (πόνος, μάζα, ακνηρώσεις, οίδημα, κνησμός). Εξέτασης: Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10): ALAT αυξημένη\*, ASAT μη φυσιολογική\*, ALAT μη φυσιολογική\*, χοληρυθρίνη αίματος αυξημένη\*, γλυκόζη αίματος αυξημένη\*, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη αυξημένη\*, μείωση βάρους, μειωμένα παγκρεατικά ένζυμα\*\*. Μη συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100): ASAT αυξημένη\*, αλκαλική φωσφατάση αίματος αυξημένη\*, χοληρυθρίνη αίματος μη φυσιολογική\*, νάτριο αίματος μειωμένο\*. Αντιδράσεις ανοσοποιητικού συστήματος: Εμπειρία ασφαλείας μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά (μη γνωστές συχνότητες): αλλεργικές αντιδράσεις (περιλαμβάνονται αγγειοοίδημα, αναφυλαξία, υπερευαίσθησία). \*με βάση ένα σύνολο μελετών σε ασθενείς με μεγαλύτερη. \*\*με βάση ένα σύνολο μελετών σε ασθενείς με GEP-NETS. Αναφορά πιθανολογούμενων αντενθίμτων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων αντενθίμτων ενεργειών μετά από τη χορήγηση οδίας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της αίσθησης οφέλους / κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο αντενθίμματα ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Α. Μεσογείων 284, 15562, Χολογός, Τηλ: +30 2132040000, Ιστότοπος: www.eof.gr. Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, 1475 Λεωκωτία, Φαξ: +357 22608649, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs. **7. Ονομασία και μόνιμη έδρα του Υπευθύνου Κυκλοφορίας:** IPSEN ΕΠΕ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, ΑΛΙΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ. Τηλ: 210 9843324 - Φαξ: 210 9887911. Περαιότερα πληροφορίες διατίθενται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. **ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:** 1. Somatuline® Autogel® ΠΧΠ. 2. Caplin M et al., NEJM 2014, 371(3): 224-233.

IPSEN ΕΠΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63 - 174 56 ΑΛΙΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 210 9843324 - 210 9859830, FAX: 210 9887911  
E-mail: ipsepe@ipen.com - http://www.ipen.com

C.A. PAPAELLINAS LTD, ΑΕΔΟΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΡΑΝΙΩΤΗ 179, 2235 ΛΑΤΕΙΑ, ΛΕΥΚΩΔΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ,  
ΤΗΛ: +357 22741741, ΦΑΞ: +357 22482155

**IPSEN**  
Innovation for patients care




**Somatuline® autogel®**  
lanreotide

ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ  
ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ  
ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

3.3.2018

Hotel Nikopolis, Θεσσαλονίκη



## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

---

- 14.25-15.30**    **NET ΠΕΠΤΙΚΟΥ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ**  
Προεδρείο: Εμμανουιλίδης Χρήστος, Διαμαντίδης Δημήτριος,  
Παπαδόπουλος Βασίλειος
- 
- 14:25-14:37    **Ο ρόλος των αναστολέων σωματοστατίνης  
στην αντιμετώπιση των NET**  
Μπούτης Αναστάσιος
- 14:37-14:49    **Συστηματική θεραπεία για NET**  
Κουμαριανού Άννα
- 14:49-15:01    **Ο ρόλος της επεμβατικής ακτινολογίας**  
Δέδες Ιωάννης
- 15:01-15:13    **Διαδραστική Παρουσίαση περιστατικών**  
Εμμανουιλίδης Χρήστος
- 15:13-15:30    Συζήτηση
- 15:30**         **Γεύμα**



**ERBITUX<sup>®</sup>**  
CETUXIMAB

**MERCK**

**Merck A.E. Ελλάς**  
Λεωφ. Κηφισίας 41-45 (Κτήριο Β)  
151 23 Μαρούσι, Αθήνα  
Τ: 210 6165100  
[www.merck.gr](http://www.merck.gr)


Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
**ΟΛΑ** τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



# ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

3.3.2018

Hotel Nikopolis, Θεσσαλονίκη



## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

---

### Ημερομηνία διεξαγωγής Συνεδρίου

Σάββατο 3 Μαρτίου 2018

### Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου

Hotel Nikopolis

Ασκληπιά 16-18, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

τηλ 2310 401 000

### Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική

### Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME- UEMS, χορηγεί 5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου.

### Οργάνωση Συνεδρίου

Αντικαρκινική Ενημέρωση

Επαγγελματική Ένωση Γενικών Χειρουργών Ελλάδος

### Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου

Premium / Congress & Social Events Solutions

Θεσσαλονίκη: Βασ. Ηρακλείου 47,

T.K. 54 623, τηλ.: 2310 226250, 2310 219407, fax: 2316 009072

Αθήνα: Ζαλοκώστα 44 & Λ. Κηφισίας, Χαλάνδρι, T.K. 15233,

τηλ.: 211 1069340, fax: 210 683822,

e-mail: [organization@premium-events.gr](mailto:organization@premium-events.gr),

fb: [premiumeventsthessaloniki](https://www.facebook.com/premiumeventsthessaloniki)

[www.premium-events.gr](http://www.premium-events.gr)





TRUST

ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφορικά  
ΟΛΕΣ τις αντιβιοτικές ενέσεις για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε  
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.



**SANDOZ**  
Biopharmaceuticals




**DEMO** ΑΒΕΕ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ



**ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ  
ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ  
ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ**

**3.3.2018**

Hotel Nikopolis, Θεσσαλονίκη



## **ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ**

---

Οι Πρόεδροι και η Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδας «Στρωματικοί και Νευροενδοκρινικοί όγκοι του πεπτικού» ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω εταιρείες για την συμβολή τους στην πραγματοποίηση της Ημερίδας.

- **ARTHROMED PLUS E.E.**
- **DEMO A.B.E.E.**
- **GALENICA A.E.**
- **GENESIS PHARMA**
- **IPSEN E.Π.Ε.**
- **MEDELLA A.E.B.E**
- **MERCK A.E. HELLAS**
- **NEW COSMOS MEDI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**
- **NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.**
- **PFIZER HELLAS A.E.**
- **RAFARM A.E.B.E.**
- **SPECIFAR A.B.E.E**
- **ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ Ι.Κ.Ε.**
- **ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**
- **ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.  
(ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ)**
- **ΚΑΡΥΟ Ε.Π.Ε.**
- **ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**
- **ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.**

# Abraxane<sup>®</sup>

nanoparticle albumin bound paclitaxel




ABX-KTX-PN-4/2015



Α. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6991918  
e-mail: [info@genesisharma.com](mailto:info@genesisharma.com), [www.genesisharma.com](http://www.genesisharma.com)

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γένεσις Φάρμα.



## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

---

Ανδρεάδης Χαράλαμπος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Γ' Τμήματος Κλινικής Ογκολογίας Α.Ν. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη
Άρσος Γεώργιος	Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Γ' Έργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
Αυγερινός Αντώνιος	MD, PhD, FEBG, Διευθυντής Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
Δέδες Ιωάννης	Επεμβατικός Ακτινολόγος - Επεμβατικός Ογκολόγος, Υπεύθυνος Ψηφιακού Αγγειογράφου Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου, Ιδρυτικό Μέλος Παγκόσμιας Επεμβατικής Ογκολογίας
Διαμαντίδης Δημήτριος	Ιατρός, Παθολόγος Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Δρεβελέγκας Αντώνιος	Καθηγητής Ακτινολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Εμμανουηλίδης Χρήστος	Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, (π) Αναπληρωτής Καθηγητής UCLA
Ζαραμπούκας Θωμάς	Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Ζαχαροπούλου Βασιλική	Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Ηλιάδης Γεώργιος	MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Καντζιούρα Αρετή	MD, MSc, Phd Candidate, Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Χημειοθεραπευτικό Τμήμα Α.Ν. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη
Καραχάλιος Δημήτριος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής 424 ΓΣΝΕ, Συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης
Κεσίσης Γεώργιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Κλινική Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκης
Κεσίσογλου Ισαάκ	Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Γ' Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
Κοσμίδης Χριστόφορος	Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Γ' Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
Κουκλάκης Γεώργιος	Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης



**Teva Grastim<sup>®</sup>**  
(filgrastim)  
30 MIU, 48 MIU

ΚΑΚ: TEVA GMBH, GERMANY

**Myocet<sup>®</sup>** |   
(liposomal doxorubicin)

ΚΑΚ: TEVA B.V., THE NETHERLANDS

**Actiq<sup>®</sup>**  
(fentanyl citrate)

ΚΑΚ: TEVA PHARMA B.V., HAARLEM, THE NETHERLANDS

ΣΥΝ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Βοηθείστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και:


Αναφέρετε:

- ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
  - ΟΛΑ τα φάρμακα
- Συμπληρώνοντας την «ΚΥΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Specifar ABEE, Λεωφόρος Κηφισίας 44, Μαρούσι, Αθήνα,  
15125, T.: 2105401500, F.: 2105401600  
info@specifar.gr, www.specifar.gr

**Specifar**  
A Teva Company


**TEVA**



## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ


Κουμαριανού Άννα	Διευθύντρια ΕΣΥ Μονάδας Αιματολογίας Ογκολογίας, Δ΄ Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Π.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα
Λέββα Σοφία	MD, MSc, PhD Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
Μικαλόπουλος Αντώνιος	Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
Μπάκα Σοφία	MD, MSc, PhD Ειδικός Παθολόγος - Ογκολόγος, Consultant in Medical Oncology, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Μπασδάνης Γεώργιος	Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.
Μπούτης Αναστάσιος	Παθολόγος Ογκολόγος, Α.Ν. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη
Ξανθάκης Ιωάννης	Dr., Παθολόγος - Ογκολόγος, Θεσσαλονίκη
Οδυσσεύς Χαράλαμπος	Γενικός Χειρουργός, Διδάκτωρ χειρουργικής Α.Π.Θ., Συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης
Παζαΐτου Παναγιώτου Καλλιόπη	Dr., Ενδοκρινολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Τμήματος Ενδοκρινολογίας – Ενδοκρινικής Ογκολογίας, Α.Ν. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη
Πανίδης Σταύρος	Χειρουργός, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
Παντολέων Δημήτριος	Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, τ.Επιμελητής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Cork, Ireland
Παπαβραμίδης Θεοδόσιος	Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
Παπαδόπουλος Βασίλειος	Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Α΄ Χειρουργικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
Παπαζιώγας Βασίλειος	Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Β΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Γ Γεννηματάς», Θεσσαλονίκη
Παραμυθιώτης Δανιήλ	Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
Πλιάκος Ιωάννης	Γενικός Χειρουργός, Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.
Ράλλης Γρηγόριος	Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Β΄, Β΄ Χημειοθεραπευτική Κλινική, Α.Ν. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη
Σπηλιώτης Ιωάννης	MD, PhD, FASPSM, Χειρουργός Ογκολόγος, Διευθυντής Μονάδος Περιτοναϊκής Κακοήθειας, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Χατζηθεόκλητος Ευθύμιος	MD, PhD, Χειρουργός, Μονάδα Χειρουργικής Παγκρέατος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Χουρμούζη Δανάη	Ακτινολόγος MD, PhD, Υπεύθυνη Μαγνητικού Τομογράφου, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης





Incluso más:

SAS\_LAR\_AON\_004\_FEB/2016/GR180271342



 **NOVARTIS**

**Novartis (Hellas) A.E.B.E.**

T.Θ. 52001

144 10 Μεταμόρφωση, Τηλ. 210 2811712

[www.novartis.gr](http://www.novartis.gr)

**Γραφείο Θεσσαλονίκης**

12ο χλμ Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών

570 01 Θέρμη, 2ος όροφος, Κτήριο Βρανάς

Τηλ. 2310 424039

**ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΗΝΗΣΗ: 210 2828812**

 **Sandostatin® LAR®**  
octreotide | IM INJECTION